



## Minska ogrässpridningen


För att förhindra att oönskade ogräs sprider sig behöver man se till att inte sprida ogräs med maskiner, foder, utsäde, halm mm. Tänk också på att ha alla spannmålslass täckta under färd, även vid ”inomgårdstransporter”, särskilt om du passerar andra lantbrukares marker. När du ändå tittar efter flyghavre – titta även efter nya ogräs och efter renkavle. Renkavlen trivs bättre i höstsäden, titta särskilt vid infarter och vändtegar, eftersom den ofta sprids med maskiner.




### Förhindra spridning av flyghavre!

- Odla inte havre om du har flyghavre!
- Variera växtföljden, öka andelen höstsådda grödor, vall, potatis och oljevaxter
- Rengör tröskan, extra viktigt vid maskinsamverkan
- Täck alltid dina vagnar
- Kontrollera fälten regelbundet, 2-3 gånger under sommaren
- Var extra noggrann med plockningen under kraftledningarna och på översvänningsmarker
- Handplockning tar mycket tid så övervärdera inte dina möjligheter att hinna med att plocka innan flyghavren drösar
- Kemisk bekämpning - effektivt vid stor flyghavreförekomst
- Använd munstycke med dubbeldusch för att träffa de små plantorna bättre från flera vinklar

**OBS! Ryck upp plantan med roten för att förhindra att den skjuter nya skott.**



**Flyghavrekärnans utseende**



## Ur Lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre framgår att:

- Marken skall, så långt det är möjligt, hållas fri från axade plantor av flyghavren.
- Växtodlingsprodukt får ej transporteras, förvaras eller hanteras på sådant sätt som innebär fara för att flyghavre sprids.

3 § p 1 och 8 § 2:a st.

## Flyghavrebekämpning i olika grödor

Dos (gram/liter/kg per ha) Produkt	HRA C-grupp	Höstvete	Höstråg	Rågvete	Vårvete	Korn	Insädd	Höstoljeväxter	Våroljeväxter	Lin	Sockerbeter	Potatis	Ärtor	Majs	Åkerbönor	Klöverfrövall	Lök	Morötter	Jordgubbar	Oljerättika	Behandlingstidpunkt	Kan blandas med	Minsta tid till bek.	Väderleksförh.	Övrigt
1,0–1,5 Agil 100 EC/Zetrola	A							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	H	A	A		C
Attribut Twin Plus + superolja (60 Attribut SG 70 +100 Hussar Plus OD)	B	X			X																E	A			B
220 Broadway + 0,5 PG26N eller 265 Broadway Star + 0,5 PG26N	B	X	X	X																	G				
1,35 Avoxa	A, B	X	X	X	X																I				
0,8 Axial	A	X	X	X	X	X															J	C			D
1,0 Event Super/Foxtrot + 0,5 superolja	A	X	X	X	X	X	X														C	B	B	B	A
1,5–2,0 Focus Ultra + 0,5 Dash	A							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	A	A		C
1,25 Leopard	A							X	X	X	X	X	X	X	X					X	K	A	A		C
Enkelbehandling 75 MaisTer + MaisOil	B													X							F			C	E
Dubbelbehandling 50–75 MaisTer + MaisOil vid varje behandlingstillfälle	B													X							F			C	E
0,3–0,5 Select + 0,3–0,5 Renol	A							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	A	A	A	D
0,6–1 Select Plus	A							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A	A	A	A	D
1,0–1,5 Targa super 55C								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	L				
Dubbelbehandling 30 Titus + 0,1 vätningsmedel /100 l vatten 20 Titus + 0,1 vätningsmedel /100 l vatten	B										X	X									D				

Den dokumenterade effekten mot flyghavre är över 95 procent hos samtliga produkter i ovanstående tabell.

Källa: Kemisk ogräsbekämpning 2021, Jordbruksverket

**Läs alltid etiketten före användning!**

# Anmärkingar

## Behandlingstidpunkt

A. Flyghavre: 1–3 blad lägre dosen, 3–5 blad högre dosen. Raps, rybs DC 12–50. Bönor DC 12–19. Ärtor DC 12–39. Sockerbetor och potatis DC 12–33. Lin: Select, efter uppkomst men före blom. Select Plus, lägre än 20 cm. Klöverfrö, vår före blom. Kपालök och morötter DC 12–45. Jordgubbar; Select, före blomning och/eller efter skörd. Select Plus DC 12–59 eller DC 91–97.  
**Observera!** Olika karenstider i olika grödor.

B. Flyghavre: 2–4 blad. Raps DC 13–32. Rybs och vårraps DC 12–32. Bönor och ärtor DC 12–39. Sockerbetor och lin DC 12–39. Potatis DC 10–39. Klöverfrö DC 12–55. Lök DC 15–45. Majs DC 12–19. Morötter DC 12–45. Jordgubbar DC 11–16.  
**Observera!** Olika karenstider i olika grödor.

C. Optimal behandlingstidpunkt, på små flyghavreplantor: Höstsäd DC 13–21. Vårsäd DC 13–15.

D. Första behandlingen: flyghavre 1–3 blad  
Andra behandlingen: 7–10 dagar senare.

E. Flyghavren 1–3 blad.

F. När flyghavren har 2–3 blad. Inte efter majsens 8-blad-stadium.

G. Grödan senast DC 30–32, Flyghavren 3–4 blad.

H. Flyghavren 3–6 blad. Höstraps DC < 50. Vårraps DC < 39. Lin 9–20 cm. Sockerbetor DC < 32. Potatis DC < 68. Bönor och ärtor DC < 59. Klöverfrö DC < 49. Lök och morötter DC < 45. Jordgubbar, före blomning samt efter skörd.  
**Observera!** Olika karenstider i olika grödor.

I. Avoxa DC 22–32.

J. Axial DC 22–39, optimal tidpunkt 30–31.

K. Flyghavre 2 blad till stråskjutning.

L. DC 11–39, Jordgubbar efter skörd på hösten.

## Kan blandas med

A. Se produktinformation, sidan 54–55.

B. Bl.a. Express 50 SX, Gratil 75 WG, Harmony Plus 50 SX, Nautius, Nuance, Trimmer SG.

C. Axial 50 EC kan tankblandas med flertalet relevanta ört-ogräsmedel, t.ex. Ariane S, Starane XL, Starane 333 HL, Express 50 SX och Mustang Forte. Max 1,5 l Ariane S. Max 0,7 l Mustang Forte. Ingen tillsats av vätmiddel eller olja behövs till blandningspartner som normalt kräver detta.

## Minsta tid till annan bekämpning

A. Se produktinformation, sidan 54–55.

B. Ally Class, Ariane S, Basagran SG, Flurostar 200, Hussar Plus OD, Lancelot, MCPA 750, Mustang, Mustang Forte, Primus, Primus XL, Saracen Delta, Starane XL, Starane 333, Tomahawk 200, och Zypar minst 12 dagar före eller efter behandling.

## Väderleksförhållanden

A. Goda tillväxtbetingelser, speciellt god markfukt, ger bäst effekt. Regn en timme efter behandling försämrar inte effekten.

B. Bäst effekt uppnås vid behandling av saftspända flyghavreplantor i god tillväxt. Vid dålig tillväxt (exempelvis vid torra) vänta med behandling tills tillväxten kommit igång igen.

C. En behandling kan göras när det är tillväxt i ogräs och gröda, samt temperaturen är över +8 °C. Behandling bör inte ske vid risk för nattfrost. Vid behandling i perioder med mycket varmt väder (temp över +25 °C) kan en behandling ge en övergående gulfärgning/ minskad tillväxt av grödan.

D. En behandling kan göras när det är tillväxt i ogräs och gröda, samt temperaturen är över +8 °C. Undvik behandling vid risk för nattfrost.

## Övrigt

A. Insådd med vallgräs (ej timotej) och klöver.

B. Även effekt mot kvickrot, lostaararter, åkerven och ört-ogräs.

C. Även effekt mot kvickrot, renkavle, spillsäd och åkerven.

D. Även effekt mot hirs, hundäxing, lostaararter, kvickrot, rajgräsarter, ren- och kärrkavle, spillsäd, timotej, vit-kärr- och ängsgröe, åkerven, ängs- och rödsvingel.

E. Blanda alltid med MaisOil. Endast i fodermajs.

Källa: Kemisk ogräsbekämpning 2021, Jordbruksverket

## Mer information på länsstyrelsens hemsida

Läs mer om bl.a. flyghavrens biologi, spridningsvägar och flyghavrelagen på [www.lansstyrelsen.se/vastragotaland\\_sokord\\_flyghavre](http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland_sokord_flyghavre). Du kan nå Länsstyrelsens växtodlingsrådgivare för råd och tips på 010-224 40 00 (växeln). Hushållningssällskapet erbjuder inte längre plockning av flyghavre.